



## Blaasspoelingen met Mitomycine

### Inleiding

U bent onlangs geopereerd aan uw blaas. De door de uroloog geconstateerde poliepen zijn verwijderd middels een operatie.

De poliepen zijn dan wel verwijderd uit de blaas maar poliepen hebben de neiging om terug te komen en kunnen ook kwaadaardig worden/zijn. Hoewel de poliepen zich meestal beperken tot het slijmvlies en dus goed weggehaald kunnen worden wil de uroloog u blaasspoelingen voorschrijven om te proberen te voorkomen dat de poliepen snel terug keren en verder in de blaaswand kunnen groeien.

Een medicijn wat hiervoor veel wordt gebruikt is mitomycine.

Mitomycine is een vorm van chemotherapie. Dit medicijn wordt rechtstreeks via een catheter in de blaas gebracht. Zo wordt een zo groot mogelijk resultaat bereikt met zo min mogelijk bijwerkingen. U krijgt door deze methode geen last van maag/darm klachten, haaruitval of afwijkingen aan de bloedcellen.

### Opname

De blaasspoelingen worden of op de afdeling dagbehandeling gegeven. U krijgt, indien u dit wilt, een uur van te voren een zetpil tegen eventuele blaaskrampen als reactie op de spoeling. Indien u op de dagbehandeling komt kunt u deze zetpil eventueel thuis al nemen.

Er wordt vervolgens een katheter ingebracht waardoor de spoelvloeistof direct toegediend wordt. Daarna wordt de katheter weer verwijderd.

Het is de bedoeling dat de spoelvloeistof een uur in de blaas blijft. Om te voorkomen dat u voortijdig moet urineren wordt er geadviseerd de avond en de ochtend voor de spoeling het drinken te beperken. Indien u plastabletten slikt kunt u deze beter na de spoeling innemen. De eerste keer verblijft u een uur op de afdeling. Eventuele bijwerkingen kunnen dan meteen behandeld worden. De volgende keren kunt u direct na het inbrengen van de spoelvloeistof naar huis. Indien u dit prettig vindt kunt U ook een uur op de afdeling blijven.

### Nazorg

De urine is 48 uur na de spoeling "besmet" en kan bij aanrakingen met de huid huidirritaties geven.

Mannen wordt geadviseerd zittend te plassen om spetteren of morsen van de urine te voorkomen. Mocht er toch urine gemorst worden dan kunt u dit het beste opnemen met een absorberende vochtige doek. Contact met de huid moet u vermijden, gebruik daarom plastic wegwerp handschoenen. Het doekje gooit u daarna weg.

Mocht er urine gemorst zijn op uw kleding dient u dit eerst uit te spoelen met koud water en daarna middels een gewone wasbeurt uit te wassen. Verder hoeft u thuis geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Geadviseerd wordt om de eerste 48 uur na de spoeling een condoom te gebruiken wanneer u gemeenschap heeft. Daarna zijn er geen speciale voorzieningen meer nodig.

### **Bijwerkingen**

Enkele uren na de spoeling kunnen er klachten optreden zoals een toenemende aandrang tot plassen. Een branderig, pijnlijk gevoel bij het uitplassen. Deze klachten lijken op een blaasontsteking en kunnen een aantal dagen aanhouden.

Mocht u koorts krijgen boven de 39 graden dan dient u contact op te nemen met de polikliniek urologie, mogelijk heeft u dan een blaasontsteking

### **Vragen**

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de arts.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige of met de polikliniek urologie.

Polikliniek urologie

Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis (015) 260 39 43

Locatie Voorburg, Diaconessenhuis (070) 340 13 69

### **Waar en wanneer**

- Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis, gebouw H poli Urologie
- Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis, afdeling Dagbehandeling
- Locatie Voorburg, Diaconessenhuis,

U wordt verwacht .....dag, ....., om.....uur.