



Blaasspoelingen met BCG

Inleiding

U bent onlangs geopereerd aan uw blaas. De door de uroloog geconstateerde poliepen zijn verwijderd middels een operatie.

De poliepen zijn dan wel verwijderd uit de blaas, maar poliepen hebben de neiging om terug te komen en kunnen ook kwaadaardig worden/ zijn. Hoewel poliepen zich meestal beperken tot het slijmvlies en dus goed weggehaald kunnen worden, wil de uroloog blaasspoelingen voorschrijven om de te proberen te voorkomen dat de poliepen snel terug keren en verder in de blaaswand kunnen groeien. Een medicijn wat hiervoor veel gebruikt wordt is BCG.

Deze spoeling bevat een oplossing van verzwakte tuberculose bacteriën. Vroeger werd dit gebruikt om mensen te beschermen tegen de tuberculose bacterie, maar later bleek dit middel ook goed werkzaam ter voorkoming van sommige vormen van blaaspoliepen. Waarschijnlijk zet BCG het lichaam aan tot afweer tegen de kwaadaardige cellen.

Dit medicijn wordt rechtstreeks via een katheter in de blaas gebracht. Zo wordt een zo groot mogelijk resultaat bereikt met zo min mogelijk bijwerkingen. U krijgt door deze methode geen last van maag/ darmklachten, haaruitval of afwijkingen aan de bloedcellen.

Opname

De blaasspoelingen worden op de afdeling Dagbehandeling gegeven. U krijgt, indien u dit wilt, een uur van tevoren een zetpil tegen eventuele blaaskrampen als reactie op de spoeling.

Als u op de afdeling dagbehandeling komt, kunt u deze zetpil thuis al nemen.

Er wordt vervolgens een katheter ingebracht waardoor de spoelvloeistof direct toegediend wordt. Daarna wordt de katheter weer verwijderd.

Het is de bedoeling dat de spoelvloeistof twee uur in de blaas blijft. Om te voorkomen dat u voortijdig moet urineren, wordt geadviseerd de avond en de ochtend voor de spoeling het drinken te beperken.

Indien u plastabletten slikt, kunt u deze beter na de spoeling innemen.

De eerste keer verblijft u twee uur op de afdeling. Eventuele bijwerkingen kunnen dan meteen behandeld worden.

De volgende keren mag u direct na het inbrengen van de spoelvloeistof naar huis. Als u het prettig vindt, kunt u ook een uur op de afdeling blijven.

Nazorg

Na het uitplassen van de vloeistof dient het toilet tweemaal doorgespoeld te worden en gereinigd te worden met chloor. Mannen wordt wel geadviseerd zittend te plassen om spetteren of morsen van de urine te voorkomen. Mocht er toch urine gemorst worden, dan kunt u dit het beste

opnemen met een absorberende vochtige doek. Contact met de huid moet u vermijden, gebruik daarom plastic wegwerphandschoenen. Het doekje gooit u daarna weg. Verder hoeft u thuis geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Omdat niet precies bekend is hoelang de resten van de tuberkelbacterie achter blijven in de blaas, wordt geadviseerd om een week na de spoeling bij alle seksuele handelingen een condoom te gebruiken. Daarna zijn er geen speciale voorzieningen meer nodig

Bijwerkingen

Enkele uren na de spoeling kunnen er klachten optreden zoals een toenemende aandrang tot plassen en een branderig, pijnlijk gevoel bij het uitplassen. Deze klachten lijken op een blaasontsteking en kunnen een aantal dagen aanhouden.

Belangrijk

Mocht u koorts krijgen boven de 39 graden, dan dient u contact op te nemen met de polikliniek Urologie, mogelijk heeft u dan een blaasontsteking.

Vragen

Deze brochure geeft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw arts.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige op de afdeling Dagbehandeling of met de polikliniek Urologie.

Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis, gebouw H (015) 260 39 43

Locatie Voorburg, Diaconessenhuis (070) 340 13 69

Waar en wanneer

- Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis, gebouw H poli Urologie
- Reinier de Graaf Gasthuis Delft afdeling Dagbehandeling Urologie
- Locatie Voorburg, Diaconessenhuis,

U wordt verwachtdag,, om.....uur.