



Niersteenvergruizing

Inleiding

U wordt binnenkort in het Reinier de Graaf ziekenhuis met de niersteenvergruizer behandeld.

In deze folder vindt u wat informatie waardoor u zich wat voor kunt bereiden.

De behandeling vindt plaats in locatie Delft, het H-gebouw van het Reinier de Graaf ziekenhuis, op de begane grond. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer voor blaasonderzoek, gelegen tegenover de polikliniek Urologie. U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Belangrijk

Sintromitis tabletten moeten 5 dagen voor de behandeling gestopt worden, Marcoumar tabletten 7 dagen van tevoren.

Vanaf 2 weken voor de behandeling mag u geen aspirine meer gebruiken, (Paracetamol mag wel worden ingenomen).

De behandeling

Het is de bedoeling dat u zich ontkleedt (het ondergoed mag aanblijven) en u gaat op een onderzoekstafel liggen. Met behulp van röntgenstralen en/of echo (geluidsgolven) wordt de steen opgezocht. Vervolgens wordt de steen met schokgolven behandeld.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de grootte en de plaats van de steen; 30 tot 40 minuten. Na de behandeling kunt u direct naar huis.

Na de behandeling

- U kunt de eerste 24 uur wat bloed plassen.
- Het lozen van gruis kan pijnlijk zijn. U mag daarvoor pijnstillers gebruiken.
- Als u veel drinkt, raakt u het gruis gemakkelijker kwijt.
- Bij een temperatuur van meer dan 38,5 ° C, of pijn die niet reageert op pijnstillers, moet u contact opnemen met de uroloog:
tijdens kantooruren (015) 260 41 13
buiten kantooruren (015) 260 30 60 toestel 38 44

U komt na 1 tot 3 weken op de polikliniek ter controle. Er wordt dan opnieuw een foto gemaakt. Als de steen nog niet verdwenen is, kan een afspraak voor een 2^e behandeling met de niersteenvergruizer gemaakt worden.

Verhinderung

Als u door ziekte of een andere dringende reden de afspraak niet kunt nakomen, neemt u zo spoedig mogelijk contact op met de secretaresse van de uroloog (015) 260 41 13. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Versie augustus 2010