



Behandeling Botuline-toxine

Inleiding

Bij u is de diagnose van een 'overactieve blaas' vastgesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat er mogelijk sprake is van een verhoogde aandrang. Mogelijk is er ook ongewenst urineverlies, de zogenoemde urge-incontinentie. Gangbare behandelingen zoals medicijnen en bekkenbodetherapie hebben bij u onvoldoende resultaat. De toediening van botuline-toxine (Botox) kan mogelijk uitkomst bieden. Botuline-toxine is geen geregistreerd medicijn, maar mag gebruikt worden door een arts.

Wat is Botox?

Botuline-toxine is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. De werking van botuline kunt u vergelijken met het doorknippen van de telefoonlijn bij u thuis. Als u de lijn doorknipt kunt u geen telefoongesprek meer voeren. En in het geval van botuline: als botuline in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen en wordt die spier verlamd.

In de urologie wordt botuline gebruikt voor behandeling van een overactieve blaas. Na injectie van botuline in de blaasspier verdwijnen bij ongeveer 70% van de patiënten de klachten ten gevolge van de overactieve blaas. De productnaam van het botuline-toxine dat door de afdeling urologie van ons ziekenhuis wordt gebruikt luidt BOTOX®.

De ingreep gebeurt via een dag opname.

Vorbereiding

U moet nuchter zijn voor de ingreep. U wordt volgens de nuchterregels 6-4-2 regel opgenomen. Kijk voor meer informatie over onder andere de nuchterregels in de folder Operatie in Reinier®.

Verpleegafdeling

Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. U krijgt dan een gesprek op de dagverpleging, waarin onder andere wordt gevraagd naar medicijngebruik, eventuele allergieën en een contactadres.

De ingreep

Hoe wordt botuline toegediend?

Voor het juiste effect moet botuline direct in de blaasspier gespoten (geïnjecteerd) worden ongeveer op 20 plaatsen. De uroloog brengt hiervoor een blaaskijker (cystoscoop) in en via een lange injectienaald wordt op de juiste plaatsen geprikt.

Op elk van die plaatsen wordt een kleine hoeveelheid botuline geïnjecteerd. Omdat de injecties pijnlijk kunnen zijn, gebeurt de ingreep onder (plaatselijke) verdoving.

Als u goed geplast heeft mag u dezelfde dag naar huis. Het kan voorkomen dat u in het begin niet geheel leeg kunt plassen. Zo nodig wordt u aangeleerd om de blaas zelf te ledigen.

Wat kunt u verwachten van de ingreep?

De behandeling heeft geen nare bijeffecten.

Soms kan na de injecties de urine iets bloederig zijn.

Het effect van de behandeling is na 3 dagen tot 3 weken merkbaar.

De behandeling is effectief bij ongeveer 70% van de patiënten. Helaas werkt botuline maar 6 tot 12 maanden. Als het is uitgewerkt kan de behandeling herhaald worden.

Een ander nadeel is dat bij sommige patiënten de botuline zo goed werkt, dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele keren per dag moeten katheteriseren.

Patiënten die twifelen of ze dit zelf katheteriserend wel aankunnen of aandurven, krijgen de mogelijkheid dit voor de ingreep te leren.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u worden verteld. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie. Ook kunt u tijdens het onderzoek vragen stellen aan de uroloog.

Waar en wanneer

Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis gebouw H Dagverpleging/Kort verblijf 3 Zuid.

U wordt verwachtdag,, om.....uur.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Telefoonnummer polikliniek urologie:

Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis (015) 260 39 43

Locatie Voorburg, Diaconessenhuis (070) 340 13 69