



TURP-operatie (Trans Urethrale Resectie van de Prostaat)

Inleiding

Onderzoek heeft aangetoond dat Uw prostaat vergroot is. U heeft samen met uw behandeld arts besproken dat u dit op operatieve wijze wilt laten verhelpen.

De ingreep die hiervoor wordt verricht wordt TURP genoemd (Trans Urethrale Resectie van de Prostaat).

Trans Urethraal betekent dat de operatie via de plasbuis (urethra) wordt uitgevoerd, dus via de natuurlijke weg.

Resectie wil zeggen dat het teveel aan prostaatweefsel wordt weggehaald.

Vorbereiding

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dient u dit van te voren te melden aan de uroloog. In overleg met hem/haar zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie moeten stoppen.

Opname

Gewoonlijk wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Er wordt wat bloed geprikt die dag. Indien u bloedverduunners gebruikt, suikerpatiënt bent of er een andere reden is waarvoor er meer controle nodig is wordt u een dag voor de operatie opgenomen.


Operatie

Na de anesthesie, meestal middels een ruggenprik, wordt er een hol instrument in de plasbuis gebracht tot aan de vergrote prostaat. De instrumenten om te opereren worden via dit holle buisje bij de prostaat gebracht. Het overtollige prostaatweefsel wordt verwijderd met behulp van een stalen lisje waardoor elektrische stroom loopt. De prostaat wordt als ware afgeschraapt totdat de plasbuis weer goed doorgankelijk is

Tussendoor wordt er steeds gespoeld zodat de losgemaakte deeltjes van de prostaat mee naar buiten komen.

Er ontstaat dus een inwendige wond. Kleine bloedinkjes worden gelijk dicht geschroeid tijdens de operatie.

Als de operatie klaar is wordt er een katheter (een dun slangetje) achter gelaten in de blaas te spoelen. De urine kan bloederig zijn.



Na de operatie

De katheter blijft gewoonlijk enige dagen in de blaas om te zorgen voor een goede urineafvoer en om de blaas te kunnen spoelen als dit nodig is, bijvoorbeeld als de urine nog bloederig is. U mag in principe het ziekenhuis verlaten de dag nadat de katheter verwijderd is en het plassen goed op gang gekomen is. U krijgt dan een aantal leefregels mee voor thuis waaronder gedurende zes weken: niet fietsen, geen zwaar werk verrichten, obstipatie voorkomen en geen sex hebben horen, hier hoort u bij de opname meer over.

Om de vorming van stolsels te voorkomen kunt u het beste veel drinken, 2 tot 2 ½ liter per dag. Voor controle krijgt u een afspraak bij uw behandeld arts op de polikliniek.

Klachten

Na de operatie wanneer u de katheter nog heeft treden vaak blaaskrampen op en kunt u een schrijnend gevoel hebben in de plasbuis. Nadat de katheter is verwijderd kunt u meer aandrang hebben om te plassen en zult u waarschijnlijk vaker naar het toilet moeten. Dit normaliseert in de loop van enkele weken. De urine kan soms nog wat bloederig zijn, wat niet verontrustend is.

U dient wel contact op te nemen als:

- u duidelijk bloedstolsels plast,
- het bloedverlies niet vermindert,
- u koorts boven de 39 graden heeft,
- u ernstige branderige pijn tijdens het plassen heeft,
- u niet meer kunt plassen.

Neem dan contact op binnen kantooruren met de polikliniek urologie en buiten deze tijden met uw huisarts, huisartsenpost of met de Spoedeisende hulp.

Mogelijke complicaties

Na de operatie kan er een bloeding optreden vanuit de prostaat met mogelijk bloedverlies en stolselvorming tot gevolg. Meestal stopt zo'n bloeding spontaan door het spoelen via de katheter. Soms is het nodig het bloedvatje dicht te "schroeien", dit gebeurt onder narcose en wordt coaguleren genoemd. Een andere complicatie die na de operatie kan optreden is een urineweg infectie die gepaard gaat met koorts. Meestal kan deze behandeld worden met antibiotica.

Vragen

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandeld arts.

Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal door de uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige op de afdeling als u opgenomen wordt of met de polikliniek urologie.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie op onze website www.rdg.nl bij patiënten onder afdelingen/urologie.